Majezik®
Flurbiprofen

Analjezik

Antienflamatuar



Sanovel

SANOVEL İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Büyükdere Cad. Dereboyu Sok. Zağra İş Merk. C Blok 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel: (0212) 285 26 70 • Fax: (0212) 285 01 81 • www.sanovel.com.tr

Majezik®
Flurbiprofen

Analjezik

Antienflamatuar



O hep yanınızda

FORMÜLÜ: Her film tablet 100 mg Flurbiprofen içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Flurbiprofen analjezik ve antienflamatuar etkilere sahip fenilpropionik asit türevi güçlü bir nonsteroidal antienflamatuar ajandır. Etkisini, prostaglandin biyosentezinin spesifik olarak siklooksijenaz enzim seviyesinde inhibisyonuna bağlı olarak ve dokuların periferik ağrı mediyatörlerine karşı sensitizasyonunu engelleyerek gösterir. ENDİKASYONLARI: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, bursit, tendinit, yumuşak doku yaralanmaları ve dismenoredе endikedir. KONTRENDİKASYONLARI: Flurbiprofen'e karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir. Flurbiprofen, Aspirin veya diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçların astım, ürtiker veya diğer alerjik reaksiyonlara yol açtığı bilinen kişilerde ve dendritik keratitste kontrendikedir. UYARILAR/ÖNLEMLER: • Kronik olarak nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarla tedavi edilen hastalarda, önemli gastrointestinal yan etkilerin görülebileceği düşünülerek hastalar dikkatle takip edilmelidir. • Diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi Flurbiprofen de renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu bulunan; geçmişte böbrek veya karaciğer hastalığı geçirmiş kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. • Flurbiprofen, konjestif kalp yetmezliği, kardiyak dekompansasyonu, hipertansiyon ve benzeri hastalıkları bulunan kişilerde sıvı retansiyonu ve ödem görülme ihtimaline karşı dikkatle kullanılmalıdır. • Yapılan çalışmalarda 12 aydan fazla sürede günde 200 mg'lık dozda alınan Flurbiprofen'in kanama süresini uzatmadığı bildirilmiş olmasına rağmen, özellikle anormal kanama potansiyeli bulunan hastalarda dikkatli olunmalıdır. • Yaşlılarda yan etki oluşturma riski daha fazladır. • Çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Hamilelik ve laktasyonda kullanımı: Hamilelik kategorisi C (3.trimesterde D'dir) Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda Flurbiprofen'in teratojenik etkisinin bulunmadığı gösterilmiş olmasına rağmen insanlar üzerindeki çalışmaların yetersizliğinden dolayı Flurbiprofen'in hamilelerde kullanılması tavsiye edilmez. Prostaglandin inhibitörü ilaçların yeni doğanlar üzerindeki olası yan etkileri nedeniyle Flurbiprofen'in laktasyonda kullanılması tavsiye edilmez. YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER: Flurbiprofen tedavisi ile seyrek olarak görülen yan etkiler hafif şiddette, doza bağlı ve geçicidirler: Dispepsi, mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı, gaz şikayetleri, diyare, konstipasyon, ürtiker, baş dönmesi, sinirlilik, kulak çınlaması, bulanık görme, fibrozis, miyozis, midriyazis, rinit, vücut ağırlığı değişimleri, ödem, amnezi, baş ağrısı, insomnia, uykuya eğilim, gastrointestinal kanama, karaciğer enzimlerinde yükselme, refleks artışı, tremor, vertigo. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Flurbiprofen, furosemid gibi diüreticlerin etkisini azaltabilir. Flurbiprofen'in diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar gibi kanama parametrelerini etkileyebileceği düşünülerek antikoagülan ilaç kullanan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Flurbiprofen ve aspirinin birlikte uygulanması durumunda Flurbiprofen'in serum konsantrasyonunda yaklaşık %50 düşüş olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle bu iki ilacın bir arada kullanılması tavsiye edilmez. Sildospirinlerin, digoksinin, lityumun ve metotreksatın serum konsantrasyonlarını artırabilir. ACE inhibitörlerinin advers etkilerini artırabilir. Ayrıca zamanda kullanılan asetilkolin klorür ve karbakolün etkisini inaktive eder. Alkol ile birlikte alınmamalıdır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; Tavsiye edilen günlük doz: Bölünmüş dozlar halinde 150 mg-200 mg'dır. Semptomların şiddetine göre günlük doz toplam 300 mg'a çıkarılabilir. • Adet sancılarında, Semptomların başlangıcında 100 mg, bunu takiben 4-6 saatte bir 50 mg-100 mg. Maksimum günlük doz 300 mg'dır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI: 100 mg Flurbiprofen içeren, 15 ve 30 film tabletlik blister ambalajlarda. Ruhsat Tarihi • No: 16.10.1995 • 175/73. Ruhsat Sahibi SANOVEL İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. Büyükdere Cad. 34398 Maslak • İstanbul. Üretim yeri: SANOVEL İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. Çanta 34580 Silivri • İstanbul. Perakende Satış Fiyatı: Majezik 100 mg 30 Film Tablet: 13.81 TL., Majezik 100 mg 15 Film Tablet: 6.88 (KDV dahil Nisan 2009) TL'DİR. REÇETE İLE SATILIR. Daha geniş bilgi için firmamızı arayınız.

SANOVEL İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Büyükdere Cad. Dereboyu Sok. Zağra İş Merk. C Blok 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel: (0212) 285 26 70 • Fax: (0212) 285 01 81 • www.sanovel.com.tr

Sanovel

17. BİLİMSEL SEMPOZYUM

04-05 Aralık 2010

TDB
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
ÇANAKKALE DİŞHEKİMLERİ ODASI

17 ÇANAKKALE 017

TR



TRUVA OTELİ
ÇANAKKALE

Değerli Meslektaşım,

17. Sempozyumumuzu gerçekleştireceğimiz bu yıl, aynı zamanda Odamızın kuruluşunun da 10. yıldönümü.

Geçen 10 yılın gururunu yaşarken bizleri yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz…

Sevgilerimizle

Dt. Aşkın ŞİMŞEK
Oda Başkanı

KAYIT BİLGİLERİ

KATILIM

Dişhekimi (TDB Üyesi) (Sempozyum+Akşam Yemeği)	100,00 TL
Dişhekimi (TDB Üyesi Olmayan)	110,00 TL
Refakatçi (Cafe Break+Akşam Yemeği)	90,00 TL
Yalnız Sempozyum	80,00 TL
Yalnız Gala Yemeği	60,00 TL

KONAKLAMA BİLGİLERİ

TRUVA OTELİ

Tek Kişilik Oda	(Oda + Kahvaltı)	80,00 TL
Çift Kişilik Oda	(Oda + Kahvaltı)	120,00 TL

NOT: Oda fiyatları sempozyum katılımcıları için geçerlidir.
Konaklama için Otel başvuruları şahsen yapılacaktır.
0-6 yaş çocuk Ücretsiz, 7-12 yaş çocuk %50 indirimlidir

TRUVA OTELİ
Cevatpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:2
ÇANAKKALE

Tel : 0286 213 0046 - 213 0047
Fax : 0286 217 09 03

http://www.truvaotel.com
truvaotel@truvaotel.com

KAYIT FORMU

(Lütfen Büyük Harflerle Doldurunuz)

KATILIMCININ;

ADI - SOYADI :
.....
.....

UNVANI :
.....
.....

DİŞHEKİMİ ( )
FİRMA YETKİLİSİ ( )

ADRES :
.....
.....

TELEFON : .....
GSM : .....
FAX : .....

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :

.....@.....

BİLGİ İÇİN

Çanakkale Dişhekimleri Odası
Atatürk Cad. No:30/2 Ömer Örenç Apt. A1 Blok Kat:1
17100 ÇANAKKALE

Tel : 0286 214 0376
0286 214 1044
Fax : 0286 214 0376

e-mail: canakkaledishekimleriodasi@hotmail.com
disodackale@ttmail.com

ÖDEME ŞEKLİ

( ) NAKİT
( ) KREDİ KARTI
( ) BANKA HAVALESİ

BANKA HAVALESİ İLE ÖDEME :

Sempozyum bedeli olan toplam .....TL'yi
...../.... / 2010 tarihinde .....dekont numarası ile Çanakkale T. İş Bankası 2300 - 1257209 no'lu TL. hesabına havale ettim.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME :
( ) VİSA ( )MASTER CARD

Kart no
( )( )( )( ) - ( )( )( )( ) - ( )( )( )( ) - ( )( )( )( )

Son Kullanma Tarihi CV2 No
(Kredi kartının arkasındaki son üç rakam)
( )( ) / ( )( ) ( )( )( )

KART SAHİBİNİN ;

Adı Soyadı : .....
Adres : .....
.....
Tel No : .....

LÜTFEN HESABIMDAN

.....TL tahsil edin. Yukarıda belirttiğim tutarın kredi kartı hesabıma borç kaydedilmesini kabul ediyorum.

...../..... /2010 İMZA

LÜTFEN ÖDEME ve KAYIT ÇİZELGESİNİ
0286 214 03 76 NUMARALI FAKSA *veya*
ÇANAKKALE DİŞHEKİMLERİ ODASI
ATATÜRK CAD. No:30/2 ÖMER ÖRENÇ APT. A1 BLOK KAT:1
17100 ÇANAKKALE

ADRESİNE GÖNDERİN

SEMPOZYUM PROGRAMI

4 ARALIK 2010 CUMARTESİ

11.00	KAYIT KABUL
11.15	AÇILIŞ
11.30 - 12.30	TRAVMA OLGULARINDA TEDAVİ PLANLAMASI **Prof. Dr. KORAY GENÇAY**
12.30 - 13.30	MUAYENEHANEDE PERİODONTAL TEDAVİ **Prof. Dr. Korkud DEMİREL**
13.30 -14.00	Kahve Arası
14.00 - 15.00	SABiT PROTEZLERDE SİMAN FİLM KALINLIĞININ ÖNEMİ **Dr. Ender TUKAY**
15.00 -15.30	Kahve Arası
15.30 - 16.30	KOMPOZİTLER **Prof. Dr. Haşmet ULUKAPI**
16.30 - 17.30	ORTODONTİK TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLANMALI? **Yaşar Bedii GÖYENÇ**
20.00	GALA YEMEĞİ

5 ARALIK 2010 PAZAR

12.00 - 13.00	PERİODONTAL HASTALIK GEÇİRMİŞ BIREYLERDE İMPLANT UYGULANIR MI? **Prof. Dr. Korkud DEMİREL**
13.00 - 14.00	DENTAL ANOMALİLERİN TEDAVİLERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR **Prof. Dr. KORAY GENÇAY**
14.00 -14.30	Kahve Arası
14.30 - 15.30	BLEACHING - DİŞ BEYAZLATMA **Prof. Dr. Haşmet ULUKAPI**